

EM米栽培マニュアル

■作付け品種： ななつぼし

■EMぼかし肥と活性液の基準

ぼかし肥 70kg/10a 以上
 活性液 70L /10a 以上

■施肥基準

ぼかし肥 : 70kg以上/10a
 化学肥料 : 窒素 5kg/10a 以下
 全道慣行栽培 (10kg) の5割以下

	資材名	10a施用量	要素成分			備考
			N	P	K	
施肥例 (泥炭)	BB050	10kg	1.0	1.5	2.0	全層
	875	12kg	2.2	0.8	0.6	側条
	合計		3.2(3.2)	2.3	2.6	
施肥例 (沖積)	BB683	20kg	3.2	3.6	2.6	全層
	444	12kg	1.7	1.7	1.7	側条
	合計		4.9(4.9)	5.3	4.3	

■防除基準

化学農薬 : 成分回数11成分以下

項目		農薬名		成分数	使用方法	適用防害虫
殺菌剤	臨機	EM2号		0	自家採種	1000倍 35°C45分
殺菌剤		タフブロック		0	200倍 時間浸漬 ²⁴	褐条病 他
殺菌剤	臨機	ビームゾル		1	1000倍又は300倍/25L	いもち病・収穫7日前
殺菌剤		食酢(穀物酢) ※注1		0	50倍	褐条病
殺虫剤	基幹	アドマイヤー顆粒水和剤	いずれか 選択	1	500~1,000倍 500ml/箱	ウンカ類・イネドロオイムシ・イネミズゾウムシ・フタオビコヤガ
殺虫剤		バズ顆粒水和剤		1	1000倍 500ml/箱	イネドロオイムシ・イネミズゾウムシ
殺虫剤		トレポン粉剤DL		1	3~4kg	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ
殺虫剤		トレポン乳剤			1000~2000倍	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ
殺虫剤	基幹	トレポンEW		1	1000倍又は300倍/25L	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ
殺虫剤	臨機	キラップ粉剤DL		1	3~4kg	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオイムシ
除草剤	基幹	◎ジャイロ1キロ粒剤	いずれか 選択	3	1kg/10a	水田一年生雑草 等
除草剤		◎ジャイロフロアブル		3	500ml/10a	水田一年生雑草 等
除草剤	基幹	チャンスタイムフロアブル		2	500ml/10a	水田一年生雑草 等
合計		11成分以下		6~7		

※注1 食酢は「穀物酢」酸度 4.2%を使用します。ラベルの裏に記載されているものを使用してください。

~~※注2 畦畔の除草剤散布を禁止します。~~

※注3 パンチャー1キロ粒剤、パンチャーフロアブルの在庫がある生産者は今年度に限り使用可能とします。

◎は新規薬剤

・ジャイロ1キロ粒剤…イブフェンカルバゾン(2.5%)ベンゾピシクロン(3.0%)ベンゾフェナップ(8.0%)含有の薬剤
 ・ジャイロフロアブル…イブフェンカルバゾン(4.5%)ベンゾピシクロン(5.4%)ベンゾフェナップ(14.3%)含有の薬剤