

# EM米栽培マニュアル

■作付け品種： ななつぼし

■EMぼかし肥と活性液の基準

ぼかし肥 70kg/10a 以上

活性液 70L /10a 以上

■施肥基準

ぼかし肥 : 70kg以上/10a

化学肥料 : 窒素 5kg/10a 以下

全道慣行栽培 (10kg) の5割以下

	資材名	10a施用量	要素成分			備考
			N	P	K	
施肥例 (泥炭)	BB050	10kg	1.0	1.5	2.0	全層
	875	12kg	2.2	0.8	0.6	側条
	合計		3.2(3.2)	2.3	2.6	
施肥例 (沖積)	BB683	20kg	3.2	3.6	2.6	全層
	444	12kg	1.7	1.7	1.7	側条
	合計		4.9(4.9)	5.3	4.3	

■防除基準

化学農薬 : 成分回数10成分以下

■防除基準						
化学農薬 成分回数11成分以下						
項目	農薬名	成分数	使用方法	成分名	適用病害虫	
殺菌剤	EM2号	0	自家採種	乳酸菌、糸状菌、光合成菌		
殺菌剤	臨機 タフブロック	0	200倍 24時間浸漬	タラロマイセフラバス、SAY-Y-94-01(微生物)	褐色病 他	
殺菌剤	ビームゾル	1	1000倍又は 300倍/25L	トリシクラゾール	いもち病・収穫7日前	
殺菌剤	食酢(穀物酢)※注1	0	50倍		褐色病	
殺虫剤	アドマイヤー顆粒水和剤	1	500~1000倍 500ml/箱	イミダクロプリド	ウンカ類・イネドロオウムシ・ミズゾウムシ・フタオビコヤガ	
殺虫剤	バズ顆粒水和剤	1	1000倍 500ml/箱	シアントラニリプロール	イネドロオウムシ・イネミズゾウムシ	
殺虫剤	トレボン粉剤DL	1	3~4kg	エトフェンブロックス	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオウムシ	
殺虫剤	トレボン乳剤	1	1000~ 2000倍	エトフェンブロックス	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオウムシ	
殺虫剤	トレボンEW	1	1000倍又 は300倍 /25L	エトフェンブロックス	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオウムシ	
殺虫剤	臨機 キラップ粉剤DL	1	3~4kg	エチプロール	カメムシ類・ウンカ類・イネドロオウムシ	
除草剤	基幹 ◎ジャイロ1キロ粒剤	3	1kg/10a	イブフェンカルバゾン、ベンゾピシクロン、ベンゾフェナップ	水田一年生雑草 等	
除草剤	◎ジャイロフロアブル	3	500ml/10a	イブフェンカルバゾン、ベンゾピシクロン、ベンゾフェナップ	水田一年生雑草 等	
除草剤	基幹 チャンスタイムフロアブル	2	500ml/10a	ピラゾレート、プロピリスルフロン	水田一年生雑草 等	

※注1 食酢は「穀物酢」酸度4.2%をしようします。ラベルの裏に記載されているものを使用してください。

※注2 畦畔の除草剤散布を禁止します。

※注3 バンチャー1キロ粒剤、バンチャーフロアブルの在庫がある生産者は今年度に限り使用可能とします。

◎は新規薬剤

・ジャイロ1キロ粒剤…イブフェンカルバゾン(2.5%)ベンゾピシクロン(3.5%)ベンゾフェナップ(8.0%)含有の薬剤

・ジャイロ1キロ粒剤…イブフェンカルバゾン(4.5%)ベンゾピシクロン(5.4%)ベンゾフェナップ(14.3%)含有の薬剤